

東都町 なないろだより 病児保育室





インフルエンザかも?と思ったら…



急に高い熱が出て、ぐったりして元気がない時は、普通の風邪ではなく、インフルエンザかもしれません。インフルエンザは感染力が強く、子ども達の間で流行しやすいため、登園できない期間 (登園停止期間) と、登園を再開できる目安が決められています。

①受診しましょう

39℃を超えるような高い熱、頭痛、関節や筋肉の痛みなどが出ます。鼻の粘膜を取って調べる検査が一般的ですが、発症直後では正しい結果が出ないことがあります。症状が出てから12~48時間以内が最適なタイミングと言われています。「いつからどんな症状が出たか」「身近に同じ症状の人がいないか」なども詳しく伝えましょう。

②しっかり治しましょう

インフルエンザの薬は、ウイルスの増殖を抑える作用があります。発症から48時間以内に服用を開始すると、発熱期間の短縮や症状の悪化を防ぐ効果が期待されます。

登園再開の目安が決まっています!


インフルエンザにかかったら、登園再開には、

- ●熱が出て(発症)から5日たっている
- ●熱が下がって(解熱)から3日たっている
- ※小学生以上では、熱が下がって(解熱) から2日たっている

この両方を満たしていることが必要です。

診断がついた翌日に熱が下がっていても、「発症から5日」の目安を満たすまで登園できません。

インフルエンザはいつ検査すべき? ➡ 原則「発症12時間後~48時間以内」 最適な検査時期 発症(発熱など) 48時間以内 24時間 ウイルス量 発症してから時間がたつほと (=検査で陽性 になりやすい) ウイルス量があがるので 検査で陽性になりやすい 原則発症してから 抗ウイルス薬 の治療効果 抗ウイルス薬は 48時間までが期限 発症早期の方が (=薬が効き 効きやすい



						V			
Bちゃん	発症	1	2	3	4 🖽	5 🖽	6 🖽	7	登園
んの場合		発熱			解熱	1	2	3	園



1

10月は21名、11月は10名のお子さんのご利用がありました。 主な病名はこちらです。

・かぜ ・胃腸炎 ・手足口病 ・中耳炎 ・小児喘息 ・リンゴ病 ・両足痛

年末年始の お知らせ

-12/31(7k)

~1/5(月)

上記の期間を休室 とさせていただきま す。ご不便をおか けしますが、よろし くお願い致します。